

# 日本卒中量表

## 1. 意识〔任选以下两表之一〕

### 〔1〕Glasgow 昏迷量表

睁眼〔E〕		应答〔V〕		肢体运动〔M〕	
自动	4	切题	5	遵嘱	6
呼唤后	3	不切题	4	刺痛定位	5
刺痛后	2	杂乱	3	刺痛躲避	4
无	1	单音节	2	刺痛屈曲	3
		无	1	刺痛伸直	2
				无	1

E + V + M = 15    A    〔记 7.74 分〕

7~14    B    〔15.47〕

3~6    C    〔23.21〕

### 〔2〕日本昏迷量表

无刺激时		刺激时	
清醒	9	呼之能醒	5
个别事不清楚	8	大声呼叫或摇动才醒	4
定向障碍	7	反复大声呼叫或摇动才醒	3
不能说出自己的名字、年龄和生日	6	只有躲避反应	2
		面及手足对疼痛刺激稍有反应	1
		无反应	0

9    A    〔记 7.74 分〕

3~8    B    〔15.47〕

0~2    C    〔23.21〕

## 2. 语言

- 〔1〕能执行指令
- 〔2〕能说出物名
- 〔3〕能复述语言
- 〔4〕能说出地点、家属名字

均能做到	A	〔1.47〕
能做到 3/4 或 2/4	B	〔2.95〕
做到 1/4 或不能	C	〔4.42〕

## 3. 忽视

无	A	〔0.42〕
部分空间忽视	B	〔0.85〕
一侧空间忽视	C	〔1.27〕

## 4. 视野缺损

无同向性视野缺损或偏盲	A	〔0.45〕
有同向性视野缺损或偏盲	B	〔0.91〕

## 5. 凝视麻痹

无	A	〔0.84〕
侧向运动不全	B	〔1.68〕
同向偏视或正中固定	C	〔2.53〕

## 6. 瞳孔异常

无	A	〔1.03〕
一侧瞳孔异常	B	〔2.06〕
双侧瞳孔异常	C	〔3.09〕

## 7. 面瘫

无	A	〔0.31〕
一侧鼻唇沟浅	B	〔0.62〕
平静时一侧口角下垂	C	〔0.93〕

## 8. Babinski 征

阴性	A	〔0.08〕
可疑	B	〔0.15〕
阳性	C	〔0.23〕

## 9. 感觉

正常	A	〔0.15〕
可疑障碍	B	〔0.29〕
明确障碍	A	〔0.44〕

## 10. 肢体运动〔卧位检查〕

手:

正常	A	〔0.33〕
大小指不能对指成环	B	〔0.66〕
能拿起茶杯	B	〔0.66〕
能动但拿不起茶杯	C	〔0.98〕
不能动	C	〔0.98〕

上肢:

正常	A	〔0.66〕
伸肘能抬臂	B	〔1.31〕
屈肘能抬臂	B	〔1.31〕
不能上举	C	〔1.97〕
不能动	C	〔1.97〕

下肢:

正常	A	〔1.15〕
伸膝能抬腿	B	〔2.31〕
能跪	B	〔2.31〕
不能跪	C	〔3.46〕
不能动	C	〔3.46〕

得分: \_\_\_\_\_