

洛杉矶院前卒中筛检表

Los Angels Prehospital Stroke Screen, LAPSS

1. 病人信息
2. 病史提供者
3. 病人处于基线水平（或无局灶体征及意识障碍）的最后时间

■ *筛检标准:*

4. 年龄大于 45 岁
5. 无癫痫发作史
6. 症状持续时间小于 24 小时
7. 病人无卧床或乘轮椅限制

■ *不符合排除，若符合继续下一条*

8. 血糖在 60-400mg/L 之间
9. 查体：观察明确的不对称体征

面部表情（示齿） （正常？低垂？）

握拳 （正常？力弱？不能？）

上肢力量 （正常？摇摆？坠落？）

■ *根据上述检查，病人仅有单侧力弱（非双侧），不符合则排除*

10. 项目 4. 5. 6. 7. 8. 9 全部符合则符合 LAPSS 筛检标准

■ 11. 如果符合 LAPSS 卒中标准，立即电话通知接诊医院，否则继续选择适当的治疗协议。（注意：即使未符合 LAPSS 标准仍可能是卒中患者）

辛辛那提院前卒中筛检表-----Cincinnati Prehospital

Stroke Scale, CPSS

下列任何一个异常强烈提示卒中:

1 口角歪斜 (令病人示齿或微笑)

正常: 两侧面部运动对称

异常: 一侧面部运动不如另一侧

2 上肢无力 (令病人闭眼, 双上肢伸出 10 秒)

正常: 双上肢运动一致或无移动

异常: 一侧上肢无移动, 另一侧下落

3 言语异常 (令病人说: 辛辛那提的天空是蓝色的)

正常: 用词正确, 发音不含糊

异常: 用词错误, 发音含糊或不能讲

NIH 院前卒中量表

出现下列一种或多种情况:

1. 有面瘫

2. 一侧肢体肌力强度不同

3. 言语异常 (言语不清, 由于运动性失语或感觉性失语而用词不当, 不能说话)