

中国卒中量表

评分标准	治疗前	溶栓后	治疗 21 天后
意识水平（最大刺激，最佳反应）： 提问：(1)年龄，(2)现在是几月（相差两岁或一个月都算正确）。 0=均正确；1=1项正确。均不正确，做以下检查。 指令（可以示范）：(1)握拳、伸掌，(2)睁眼、闭眼。 3=均完成；4=完成1项。都不能完成，做以下检查。 强烈局部刺激（健侧肢体）：6=躲避刺激或防御动作； 7=肢体回缩；8=肢体伸直；9=无反应			
水平凝视：0=正常；2=侧视障碍；4=同向凝视			
面瘫：0=正常；1=轻瘫；2=全瘫			
言语：0=正常；2=基本可以交谈，但表达困难；3=简单交谈； 5=几个单字式的联系；6=不能			
肩：0=5度；1=4度；2=3度，抬臂高于肩；3=3度，平肩或以下； 4=2度；5=1度；6=0度			
手：0=5度；1=4度；2=3度，握空拳、能伸；3=3度， 能屈指、不能伸；4=2度、屈指不能及掌；5=1度；6=0度			
下肢：0=5度；1=4度；2=3度，抬腿45度以上，踝或趾可动； 3=3度，抬腿45度左右，踝及趾不能动； 4=抬腿离床，不足45度；5=水平移动；6=0度			
步行能力：0=正常；1=独立行走5米以上，跛行； 2=独立行走，需扶拐；3=有人扶行； 4=不能行走，但可站立；5=坐，不需支持；6=卧床			
总得分			